



Grandes Cultures

Champagne-Ardenne

Bulletin n°328 du 2/07/96 : 1 page

d'après les observations du 1er/07/1996

CLIMAT

Quelques rares pluies ont eu lieu ce week-end. Elles sont insuffisantes malgré des disparités selon les secteurs de la région.

Pluie entre le 27/06 et le 1er/07 matin

Lieu	Nombre de jours	Cumul en mm
08 Rethel	3	1
Juniville	2	2,6
10 Troyes	2	2,2
Romillys/Seine	1	0,6
51 Reims	2	1,2
St Jean/T.	2	4,8
Dommartin-L.	1	0,4
Frignicourt	1	1
52 St Dizier	2	3,4
Chaumont	3	1,4
Langres	2	3

POIS

Stade gousses pleines. Jaunissement des parcelles.

Maladies

Le mildiou est toujours fréquent. Il n'y a pas d'évolution de l'ensemble des autres maladies : anthracnose, botrytis et rouille compte-tenu du temps frais. On peut juste noter quelques symptômes de botrytis en augmentation dans des parcelles non traitées.

■ **Nos conseils : plus d'intervention.**

Tordeuses

On note toujours de nouvelles captures dans les pièges. Dans la plupart de nos parcelles de suivi, on compte plus de 600 captures cumulées, avec parfois des cumuls à plus de 1000. Les dégâts dans les gousses sont maintenant bien visibles.

TOURNESOL

Stade boutons floraux fermés.

Phomopsis

Le risque subsiste mais il est faible. La dernière projection d'ascospores a été enregistrée le 30 juin mais les températures basses sont peu propices à la contamination de ces spores.


■ **Nos conseils : les variétés sensibles et les zones concernées sont protégées.**

MAIS

Pas d'évolution des stades : de 8-10 feuilles à 1,4 m.

Pyrale

Le vol se poursuit lentement et les cumuls de captures restent faibles. Les conditions climatiques sont toujours défavorables aux pontes. La 1ère ponte fraîche a été trouvée à Rigny le Ferron (Pays d'Othe). Ces pontes se trouvent sur la face inférieure des feuilles et souvent sur les feuilles des étages intermédiaires. Elles sont de couleur blanche lorsqu'elles sont fraîches (à gauche) puis plus orangées et à tête noire (à droite) lorsqu'elles sont âgées.



ponte fraîche

ponte âgée

Lieu	Captures cumulées
08 Breuilly	4
Mouzon	11
Beaumont en Argonne	15
Lumes	5
Noyers P. Mangis	14
Le Thour	9
51 Pévy	2
Tramery	15
Aigny	2
Les Rivières Henrue	8
10 Rumilly les Vaudes	4
St Pouange	3
52 Blessonville	44

■ **Nos conseils : dans les zones précoces (Aube, Haute-Marne), la date d'intervention devra se situer autour du 7-8 juillet. Pour les zones plus tardives (Marne, Ardennes), l'insecticide sera à réaliser autour du 13-15 juillet.**

Toutes cultures Noctuelles

Des défoliations complètes (déjà signalées dans les précédents bulletins) ont lieu sur chanvre, pois, betteraves non traitées. Même après un traitement, de nouvelles sorties de chenilles ont lieu.

■ **Nos conseils : pour éviter de nouvelles défoliations et dans le cas d'observation de jeunes chenilles, on peut renouveler l'insecticide.**

POIS : pas d'évolution des maladies.

TOURNESOL : risque phomopsis faible.

MAIS : rares lères pontes de pyrale.

TOUTES CULTURES : toujours des dégâts de noctuelles.

Renouveler l'insecticide dans certains cas.

729

4 30 43 153

03

527